



DEGASIN BABY NA BRUŠKO ODPORUČA AJ ZAJKO UŠKO

Degasin* je vhodný od 0 mesiacov

- na symptomatickú liečbu detskej koliky
- ako záchranné opatrenie v prípade prehltnutia tekutého mydla alebo po otrave tekutým mydlom
- na žalúdočno-črevné ťažkosti vyvolané plynatosťou, ako je nadúvanie, pocit plnosti, bolestivé kŕče brucha, grganie, funkčná porucha trávenia, dráždivé hrubé črevo a pooperačné bolesti spojené s plynatosťou

Informujte sa u svojho pediatra, v lekárňach alebo telefonicky na 0800 191 191

*Degasin simetikón 66,6 mg/ml – perorálna emulzia

Zdravotnícka pomôcka. Pred použitím si prečítajte návod na použitie.

STADA PHARMA Slovakia, s.r.o., Digital park III., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, www.stada.sk

www.degasin.sk



Ako užívať DEGASIN

Vždy užívajte DEGASIN presne tak, ako je to uvedené v tomto návode na použitie. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárniky.
Pokiaľ vám váš lekár neodporučil ináč, odporúčaná dávka je:

• V prípade žalúdočno-črevných ťažkostí vyvolaných plynatosťou:

Dojčatá a malé deti kŕmené z fľaše

20 kvapiek (0,6 ml) DEGASIN sa pridáva do každej fľaše. DEGASIN sa ľahko zmiešava s inými tekutinami, napr. s mliekom. V prípade dojčiat, ktoré sú dojčené, sa DEGASIN podáva pred každým kŕmením s malou lyžičkou.

Batoľatá

U batoliat sa môže užívať 20 kvapiek (0,6 ml) DEGASIN s jedlom alebo po jedle. V prípade potreby možno užiť ďalších 20 kvapiek DEGASIN aj pred spaním.

Deti školského veku a dospelí:

Deti školského veku: 30 až 40 kvapiek (0,9 až 1,2 ml)

Dospelí: 40 až 60 kvapiek (1,2 až 1,8 ml)

Táto dávka sa môže opakovať každé 4 až 6 hodín a v prípade potreby sa môže zvyšovať. DEGASIN možno užívať s jedlom alebo po jedle a v prípade potreby aj pred spaním.

Fľaša sa pred použitím musí dobre potrepáť! Na správnu tvorbu kvapiek držte fľašu kolmo nadol a prstom zľahka poklepte po dne fľaše. Ak držíte fľašu pod uhlom, môže byť rýchlosť tvorby kvapiek znížená.

Dĺžka používania závisí od rozvoja príznakov.

DEGASIN emulzia sa v prípade potreby môže užívať aj dlhšie obdobie. Aby sa však zabránilo riziku maskovania základného klinického stavu, DEGASIN sa nemá užívať dlhšie ako 4 týždne za sebou bez porady s lekárom.

• Na prípravu zobrazovacích vyšetrení:

Na podanie v týchto prípadoch je lepšie odstrániť kvapkadlo z fľaše. Dospelí a deti od 6 rokov: 1-2 čajové lyžičky (5-10 ml) DEGASIN v deň pred vyšetrením a 1 čajová lyžička (5 ml) ráno pred vyšetrením po dohode s vyšetrujúcim lekárom.

• Otrava saponátmi:

V prípade otravy saponátmi sa dávkovanie riadi závažnosťou otravy. Ako najmenšia dávka sa odporúča 1 čajová lyžička (5 ml) DEGASIN.

Ak užijete viac DEGASIN, ako máte

Dobre sa tolerujú dokonca aj veľké množstvá, keďže účinná látka emulzie vykazuje iba fyzikálny účinok a biologicky i chemicky je úplne neaktívna.

Ak zabudnete užiť DEGASIN

Ak zabudnete užiť DEGASIN, pokračujte v liečbe bezo zmeny dávky.

